

Goudinjecties (Aurothiomalaat, Tauredon ®)

Uw reumatoloog heeft u goudinjecties voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Dit is een klassieke reumaremmers. Om dit medicijn goed te gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van goudinjecties

Goudinjecties worden gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis. Goudinjecties kan de oorzaak van uw reumatische aandoening niet wegnemen. Wel kan het uw ziekte remmen. Daardoor verminderen de ontstekingen en kunnen klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten na enige tijd afnemen. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat de goudinjecties beginnen te werken.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u goudinjecties in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Als u goudinjecties samen met bloedverduunners van de trombosedienst (zoals acenocoumarol=Sintrom® of fenprocoumon=Marcoumar®) gebruikt, dan heeft u op de plaats van de injectie meer kans op een blauwe plek. Vertel uw huisarts, uw specialist en de trombosedienst daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen goudinjecties

Bijwerkingen kunnen optreden. Deze bijwerkingen zijn vaak reden om de dosis en de frequentie van de goudinjecties aan te passen. Stoppen is meestal niet nodig.

Meest voorkomend:

- Jeuk en huiduitslag.
- Ontstekingen in het slijmvlies van de mond, zoals pijnlijke plekjes.

Soms/zelden voorkomend:

- Erge keelpijn met koorts, herhaaldelijk een bloedneus en snel blauwe plekken

krijgen (tekenen van stoornis in bloedaanmaak).

- Eiwit in de urine (kan aangetoond worden met urineonderzoek). Soms merkt u dat uw urine gaat schuimen, echter vaak merkt u hier niets van.

Wijze van toediening

Goudinjecties worden door uw huisarts of een (wijk)verpleegkundige toegediend in de spieren van uw bil of bovenbeen. In het begin krijgt u een goudinjectie per week. Vaak is na verloop van tijd een injectie per maand voldoende.

Waarschuwingen

- Neem contact op met uw reumatoloog of huisarts bij: koorts, koude rillingen, ernstige infectie, ernstig ziek zijn en bij het optreden van bijwerkingen.

Controles

Om eventuele bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken, zal uw reumatoloog regelmatig uw bloed en urine laten onderzoeken. Dit gebeurt meestal één keer per twee injecties. Na een jaar kunnen de controles minder frequent worden uitgevoerd. De uitslag van de bloed en urine controle is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft niet te bellen of langs te komen hiervoor. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslagen afwijkend zijn.

Tandheelkundige ingrepen

Goudinjecties mag u in de periode voor, tijdens en na een tandheelkundige ingreep meestal blijven gebruiken. Informeer tijdig degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met goudinjecties.

Geplande operaties

Goudinjecties kunt u meestal in de periode voor, tijdens en na een geplande operatie blijven gebruiken. Bij grote operaties of als u erg ziek bent kan uw reumatoloog of diegene die de operatie uitvoert alsnog voor de zekerheid besluiten om goudinjecties tijdelijk te staken. Het is verstandig om uw reumatoloog tijdig te informeren dat u een operatie moet ondergaan. Informeer tijdig degene die de operatie uitvoert dat u wordt behandeld met goudinjecties.

Reizen en vaccinaties (inentingen)

- **Griepvaccinatie:** kunt u veilig via de huisarts laten toedienen tijdens de behandeling met reumaremmers aangezien het geen levend verzwakt vaccin bevat. Toediening hiervan wordt zelfs aanbevolen.
- **Reisvaccinaties:** kunt u veilig laten toedienen indien u naast goudinjecties géén andere reumaremmers gebruikt. **Let op:** bij gebruik van goudinjecties in combinatie met bepaalde andere reumaremmers (sommige klassieke- en alle biologische reumaremmers) mag u geen 'levend verzwakte vaccinaties' toegediend krijgen. Voorbeelden hiervan zijn vaccinaties tegen gele koorts, pokken, poliovirus, BCG (tegen tuberculose) en BMR (tegen bof, mazelen en rode hond). Door bepaalde reumaremmers kunnen vaccinaties minder effectief zijn. Uw reumatoloog, reumaverpleegkundige en/of degene die de vaccinaties zal toedienen kan u meer uitleg en adviezen hierover geven.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger wilt worden, is overleg met uw reumatoloog of reumaverpleegkundige noodzakelijk. Goudinjecties kunnen schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht. Doorgaans is het advies om de goudinjecties twaalf maanden voor de zwangerschap te staken.

Als u goudinjecties gebruikt, mag u geen borstvoeding geven.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw reumatoloog, reumaverpleegkundige of bezoek onze website.

Telefoonnummer polikliniek reumatologie:

- 088 708 34 03

Website afdeling reumatologie:

- www.zgt.nl/reumatologie

Disclaimer

Deze patiëntfolder is een verkorte versie van de officiële bijsluiter en vervangt deze niet.