

Röntgenonderzoek van de endeldarm (Defaecografie)

Uw behandelend specialist heeft u voor het maken van foto's van de endeldarm verwezen naar de afdeling radiologie (röntgen). Dit is een afdeling waar radiologen en radiodiagnostisch laboranten met behulp van verschillende technieken, afbeeldingen van het lichaam maken. Bij het maken van foto's wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen kunnen verschillende delen in het lichaam zichtbaar maken en geven daarvan een afbeelding op een beeldscherm. Nadat de foto's gemaakt zijn, worden deze door een radioloog beoordeeld.

Melden

U kunt zich melden aan de balie van de radiologie, route 1.6.

De baliemedewerker verwijst u naar de juiste wachtruimte. Neem een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee.

Verhinderend

Wanneer u door omstandigheden niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op. U vindt de contactgegevens onderaan deze folder.

Waarschuwingen

- Het is ongewenst dat dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Patiënten die hierover in onzekerheid verkeren, dienen contact op te nemen met de afdeling radiologie.
- Het contrast, wat via de anus wordt ingebracht, is verdikt met Brinta. Patiënten met een glutenallergie moeten dit telefonisch melden voor het onderzoek.

Vorbereiding

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Wel is voor het onderzoek een goede contrastvulling van uw dunne darm noodzakelijk.

Daarom moet u twee uur voor het onderzoek 200 ml vloeibaar bariumcontrast drinken.

Dit bariumcontrast kunt u op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur ophalen bij de receptie radiologie in Almelo en Hengelo.

Patiënten uit Hardenberg of patiënten die op grote afstand van het ziekenhuis wonen kunnen 2 uur voor het onderzoek zich melden bij de receptie van de radiologie in Almelo en kunnen dan dit bariumcontrast krijgen en opdrinken.

Het is wenselijk om een lang shirt of T-shirt mee te nemen.

Bereiding vloeibare bariumcontrast

- Schud de beker Micropaque HD poeder zo, dat de poeder loslaat van de bodem.
- Voeg 200 ml koud water toe. (in de gebruiksaanwijzing staat 65 ml maar u moet 200 ml aanhouden)
- Deksel er weer opdraaien en goed schudden, zodat de poeder en het water zich vermengen tot een vloeibare/drinkbare pap.

Verloop van het onderzoek

U wordt opgehaald uit de wachtruimte en naar de kleedkamer begeleidt. Daar wordt u verteld welke kledingstukken u uit moet doen voor het onderzoek. U komt op een röntgentafel te liggen. Bij vrouwen wordt voor het onderzoek de vagina gemarkeerd door het inbrengen van een gel. Een radioloog of arts-assistent brengt een slangetje in de schede. Via dit slangetje wordt gel in de vagina gebracht. Vervolgens komt u op de linker zijde te liggen en brengt de radioloog of arts-assistent een slangetje in de anus. Via dit slangetje wordt er, bariumpap (contrastmiddel) verdikt met Brinta, in de endeldarm gebracht. Na het inbrengen van het contrast komt u op een soort toilet te zitten, welke gemonteerd is op de röntgentafel. Er worden foto's gemaakt terwijl u moet proberen het contrast uit te persen.

Na afloop van het onderzoek

De eerste dagen na het onderzoek kunt u bij de ontlasting resten van de witte contrast pap aantreffen. Over het algemeen zult u van het onderzoek weinig hinder ondervinden.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de medisch specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze uitslag is ongeveer vijf werkdagen na het onderzoek bekend bij de aanvrager.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden. Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet.

Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt