

Het verloop van de Docetaxel/ Darolutamide

U begint met een chemokuur en hormoontherapie. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **Docetaxel** (= Taxotere)
2. **Darolutamide** (= Nubega)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
D																				
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

Wijze van toediening

De Docetaxel wordt via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. De toediening duurt ongeveer anderhalf uur.

De darolutamide kunt u zelf innemen want dit zijn tabletten. U start hiermee op de ochtend van de chemokuur en blijft u twee keer per dag doorslikken. Darolutamide neemt u in zijn geheel in tijdens de maaltijd.

De volgende kuur start in principe drie weken na dag één als de bloedsuitslagen goed zijn.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke en begint meestal twee à drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid.
- Af en toe krijgt iemand een allergische reactie op deze kuur. Dit treedt meestal op tijdens de toediening van Docetaxel. Het is belangrijk dat u eventuele klachten direct meldt aan de oncologieverpleegkundige
- U kunt spier- en/of gewrichtspijn krijgen. Wanneer nodig mag u maximaal 4 keer per dag 1000 mg paracetamol innemen.
- U kunt vocht vasthouden en daardoor iets in gewicht toenemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of tenen. Meld dit bij een volgend bezoek aan uw medisch specialist of verpleegkundig specialist.
- De behandeling kan effect hebben op uw nagels. Uw nagels kunnen een andere kleur krijgen of loslaten. Deze klachten beginnen meestal een aantal weken na de start van uw behandeling. Uw oncologieverpleegkundige kan tips geven hoe hiermee om te gaan.
- Over het algemeen is de Darolutamide goed te verdragen. Klachten van algehele malaise zoals vermoeidheid en spierpijn kunnen optreden.

- Resten cytostatica kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om moet gaan. Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.