

Mantoux test

Uw medisch specialist heeft u verwezen voor een mantoux test. Met deze test kunnen we vaststellen of u ooit in aanraking bent geweest met bepaalde vormen van tuberculose. Soms is een mantoux test nodig in verband met het voorschrijven van medicatie.

Vorbereiding

Er is geen voorbereiding nodig voor deze test.

Het onderzoek

Onder de huid van uw linker onderarm wordt een kleine hoeveelheid vloeistof ingespoten. Daardoor ontstaat er direct een kleine zwelling die na een paar uur verdwijnt.

Als u in contact bent geweest met de tuberculose bacterie ontstaat er binnen drie tot vijf dagen een huidreactie op de plek van de injectie. Als u in het verleden een BCG vaccinatie hebt gehad geeft dat meestal ook een huidreactie.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt vijf minuten.

Uitslag

Twee tot drie dagen na de test wordt een eventuele huidreactie opgemeten door de longarts of een longfunctieanalist.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u bellen met het secretariaat van het Hart Long Centrum, telefoonnummer 088 708 33 00.

Locatie en route

Voor het onderzoek kunt u zich melden bij het secretariaat van het Hart Long Centrum, ziekenhuislocatie Hengelo, routenummer 0.19.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien,

persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt