

## Het verloop van de F-NalIri kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. F-**N**aliri
2. **L**eucoverin
3. **F**lourouracil

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>N</b>													
<b>L</b>													
<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>											

### Manier van toediening:

Het medicijn wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm of via een port-a-cath.

Voor degene die een infuus krijgt, vindt deze behandeling plaats op de verpleegafdeling oncologie van locatie Almelo. Voor deze chemokuur wordt u twee nachten opgenomen. De volgende kuur start in principe twee weken na dag één als de bloeduitslagen goed zijn.

Degene die een port-a-cath heeft, krijgt de eerste behandeling klinisch, dat wil zeggen een opname op de verpleegafdeling oncologie van locatie Almelo. De vervolgcuren kunnen vervolgens poliklinisch gegeven worden op de dagbehandeling oncologie locatie Hengelo. Dat wil zeggen dat de eerste dag op de dagbehandeling plaatsvindt en dag 2 en 3 thuis.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar kan gaan uitvallen, mogelijk wordt het alleen dunner. Dit is van tijdelijke aard. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventueel haarwerk kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Liposomaal Irinotecan heeft als meest voorkomende bijwerking het optreden van diarree. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan vier maal daags diarree heeft, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op uw ontlastingspatroon, de medicijnen die u krijgt voorgeschreven kunnen obstipatie (verstopping) als gevolg hebben.
- Stomatitis: een pijnlijk, rode of gezwollen mond of zweren in de mond.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt)

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 [facebook.com/zgtinfo](http://facebook.com/zgtinfo)

 [linkedin.com/company/zgt](http://linkedin.com/company/zgt)

 [twitter.com/zgt\\_info](http://twitter.com/zgt_info)

 [youtube.com/user/zgtinfo](http://youtube.com/user/zgtinfo)

- Hand-, voet-, huidreactie: als de handen en/of de voeten pijnlijk, gezwollen en rood zijn of tintelen.
- Pijn op de borst: pijn in het midden van uw borst, vooral tijdens inspanning.
- Een rode of paarsachtige uitslag die zich verspreidt.
- Resten cytostatica kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

### **Check uw dossier op MijnZGT**

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt).