

Het verloop van de T-DXd kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit één medicijn.

1 Trastuzumab Deruxtecan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
T-DXd																					

Wijze van toediening:

Het medicijn wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT. De eerste toediening duurt in totaal twee uur. Wanneer met zekerheid is vastgesteld dat u geen klachten heeft gehad van de eerste toediening duren de vervolgekuren ongeveer 1 uur. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de 3 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee á drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op deze kuur.
- U kunt vocht vasthouden en daardoor iets in gewicht toenemen.
- De andere specifieke bijwerkingen die kunnen optreden bij Trastuzumab deruxtecan vindt u terug in de patiënten informatie van de Destiny studie.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo