

Colchicine

Uw reumatoloog heeft u colchicine voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische ziekte. Colchicine wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van jicht, pseudojicht en de ziekte van Behçet. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van colchicine

Colchicine vermindert de ontstekingsreactie in de gewrichten. Het geneesmiddel wordt daarom gebruikt voor de behandeling van een acute jicht- of pseudojichtaanval en ter voorkoming van een jichtaanval bij het begin van urinezuur-verlagende therapie. Colchicine werkt snel, vaak al binnen een dag. Bij de ziekte van Behçet is de behandeling met colchicine chronisch en onderdrukt het de zweertjes(aften) in de mond en keel.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

U kunt colchicine in combinatie met veel, maar niet alle geneesmiddelen gebruiken. Colchicine kunt u beter niet tegelijk met verapamil, claritromycine, erytromycine, ciclosporine en tolbutamide gebruiken, tenzij de colchicine dosis verlaagd wordt. Bij gelijktijdig gebruik met cholesterol-verlagers (statine of fibraat) heeft u een grotere kans op (hevige) spierpijn. Deze bijwerking treedt slechts zelden op. Krijgt u nieuwe (hevige) spierpijn overleg dan met uw huisarts of specialist en stop alvast met de colchicine en/of de cholesterolremmer. Heeft u geen spierklachten dan kunt u de colchicine en cholesterolremmer zonder problemen gelijktijdig gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen colchicine

Bijwerkingen kunnen optreden.

Meest voorkomend

- Maag- en darmklachten (met name diarree, misselijkheid en buikpijn)

Soms/zelden voorkomend

- Spierpijn

Wijze van innemen

Colchicine is een medicijn in de vorm van tabletten van 0,5 milligram. Uw reumatoloog vertelt u hoeveel tabletten per dag u moet innemen. De dosis wordt aangepast als u last hebt van bijwerkingen of nierproblemen.

Waarschuwingen

- Neem contact op met uw reumatoloog of huisarts bij bijwerkingen.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van colchicine kan in zeldzame gevallen de vruchtbaarheid van de man verminderen. Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt ontraden. Bespreek uw zwangerschapswens tijdig met uw reumatoloog.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw reumatoloog of bezoek onze website.

Telefoonnummer polikliniek reumatologie:

- 088 708 34 03

Website afdeling reumatologie:

- zgt.nl/reumatologie

Disclaimer

Deze patiëntfolder is een verkorte versie van de officiële bijsluiter en vervangt deze niet.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.