

Het verloop van de Docetaxel / Carboplatin / Trastuzumab kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **Docetaxel** (=Taxotere)
2. **Carboplatin**
3. **Trastuzumab**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| D C T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT.

De eerste toediening duurt in totaal ruim zes uur. Wanneer met zekerheid is vastgesteld dat u geen klachten heeft gehad van de eerste toediening duren de vervolgcuren ruim drie uur. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen die over het algemeen een aantal dagen aanhouden. U mag zo nodig maximaal vier keer daags 1000 mg paracetamol innemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee á drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en/of de vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Het is mogelijk dat na enkele kuren uw gehoor (blijvend) wat afneemt. Geef dit door aan uw arts of verpleegkundig specialist.
- Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op deze kuur.
- U kunt vocht vasthouden en daardoor iets in gewicht toenemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 [zorgkaart http://bit.ly/1y7WjBP](http://zorgkaart.bit.ly/1y7WjBP)

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo

- Resten cytostatica kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

De specifieke bijwerkingen die kunnen optreden bij Trastuzumab vindt u terug in het bijgevoegde informatieboekje.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.