

Het verloop van de cabazitaxel/ darolutamide

U begint met een chemokuur en hormoontherapie. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. Cabazitaxel (= Jevtana)
2. Darolutamide (= Nubega)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
C																				
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

Wijze van toediening

U krijgt cabazitaxel via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt gebeurt op de dagbehandeling oncologie van de ZGT.

Via het infuus krijgt u medicijnen, deze zorgen ervoor dat u geen allergische reactie krijgt.

Krijgt u klachten tijdens de toediening? Meld deze dan direct aan de oncologieverpleegkundige. De toediening duurt ongeveer anderhalf uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuikerslagen om de drie weken gegeven. De darolutamide kunt u zelf innemen want dit zijn tabletten. U start hiermee op de ochtend van de chemokuur en blijft u twee keer per dag doorslikken. Neem darolutamide in zijn geheel in tijdens de maaltijd.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar kan gaan uitvallen. Dit is tijdelijk. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventueel haarwerk kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- U kunt spier- en/of gewrichtspijn krijgen. Neem wanneer nodig maximaal vier keer per dag 1000 mg paracetamol in.
- U kunt vocht vasthouden en daardoor iets in gewicht toenemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of tenen. Meld dit bij een volgend bezoek aan uw medisch specialist of verpleegkundig specialist.
- Als veel voorkomende bijwerking kan diarree optreden. Neem contact op met uw medisch specialist, verpleegkundig specialist of met de oncologieverpleegkundige wanneer dit optreedt, zij zullen u adviseren over een passende behandeling.
- Over het algemeen is Darolutamide goed te verdragen. Wel kan het zijn dat u zich niet zo lekker voelt en bijvoorbeeld vermoeidheid bent en spierpijn hebt.
- Resten cytostatica kunnen tot dag acht in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om moet gaan.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.