

Huidallergietest

Met behulp van deze test kan worden nagegaan of u allergisch bent voor een bepaald allergeen/voedingsmiddel. Een allergeen is een lichaamsvreemde stof. Afhankelijk van het aantal te testen allergenen duurt het onderzoek 30 tot 60 minuten.

Verloop van het onderzoek

De test vindt plaats met behulp van een aantal vloeistoffen waarin allergenen opgelost zijn. De vloeistof zal op de binnenkant van uw onderarm of op uw rug worden gedruppeld. Met een klein lancet wordt de huid aangeprikt, zodat de vloeistof net onder de huid contact kan maken. Als er een voedingsmiddel getest wordt, zal deze voedingsmiddel eerst aangeprikt worden met een klein lancet waarna met hetzelfde lancet de huid op uw onderarm wordt aangeprikt. Na ongeveer 15 minuten kan de uitslag van de test worden bekeken. Wanneer u reageert op een bepaald allergeen of voedingsmiddel zal er een iets jeukende rode uitslag ter plaatse ontstaan. De huidtest met Histamine moet bij iedereen opkomen. Deze uitslag zal overigens snel weer wegtrekken.

Vorbereidingen thuis

- Medicijnen tegen allergie en enkele antidepressiva dienen 72 uur van tevoren worden gestaakt (zie medicijnlijst z.o.z.), na overleg met de allergoloog.
- Bèta-blokkers dienen 48 uur van te voren gestaakt te worden, na overleg met de allergoloog
- Gebruik geen bodylotion e.d. op onderarmen.
- De te testen voedingsmiddelen dient u zelf mee te brengen als dit voor u van toepassing is. Dit is dan aan u doorgegeven.

Uitslag

De behandelend medisch specialist deelt u de uitslag van het onderzoek mee.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek allergologie ZGT, telefoonnummer 088 708 52 30.

Afspraak

Er is voor u een afspraak bij de polikliniek allergologie gemaakt op:

..... dag ... / ... / ...

..... uur

en bij dr. Miesen / dr. Ossekoppele

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Medicijnenlijst t.b.v. huidallergie

Medicijnen tegen allergie en jeuk 72 uur van te voren staken

acrivastine	mehydroline
Aerius	mizolastine
alimemazine	Mizollen
Allerfre	montelukast
Allergodil (Azelastine)	Nalcrom
Atarax	Neoral
cetirizine	oxatomide
ciclosporine	Periactin
Claritine	Polaramine
clemastine	Prevalin
cromoglicinezuur	promethazine
cyproheptadine	Reactine
desloratadine	Rupatadine
dexchlorfeniramine	Rupafin
dimetindeen	Semprex
Dymista	Singulair
ebastine	Tavegil
Fenistil	Telfast
fexofenadine	terfenadine
hydroxyzine	Tinset
Kestine	Xyzal
ketotifen	Zaditen
levocetirizine	Zyrtec
Livocab(Levocabastine)	
Lomudal	
loratadine	

Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid 72 uur van te voren staken

Betahistine	Emesafene
Betaserc	Meclozine
Chloorcyclizine/ cinnarizine	Meclozine/pyridoxine
Cinnarizine	Primatour
Cyclizine	Suprimal
Doxylamine/pyridoxine Xonvea	

Antidepressiva

72 uur van te voren staken, altijd na overleg met de allergoloog

Amitriptyline	Prothiaden
Anafranil	Quetiapine
Clomipramine	Remeron
Dosulepine	Sarotex
doxepine	Seroquel
maprotiline	Sinequan
mianserine	Tolvon
mirtazapine	trazodon
Nortrilen	Trazolan
nortriptyline	Tryptizol

Bètablokkers,

48 uur van te voren staken, altijd na overleg met de allergoloog

Acebutalol	Metoprolol
Atenolol	Nebilet
Bisoprolol	Nebivolol
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorm	Propanolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

Maag/darm medicijnen

72 uur van te voren staken

Axid	Pepcidin
cimetidine	ranitidine
famotidine	Tagamet
nizatidine	Zantac
Pepcid	

Medicijnen tegen hoesten, 72 uur van te voren staken

Oxomemazine
Toplexil