

Port-a-Cath

Inleiding

Uw medisch specialist heeft u een toedieningssysteem aanbevolen dat onderhuids ingebracht wordt. Het systeem heet Port-a-Cath. Het is heel geschikt voor het geven van medicijnen of andere vloeistoffen. Hij kan ook worden gebruikt voor bloedafname. In deze folder leest u informatie over de plaatsing en de verzorging van de Port-a-Cath.

Wat is een Port-a-Cath?

De Port-a-Cath is een klein kastje wat onder uw huid wordt geplaatst. Dit kan meestal op een onopvallende plaats op uw borst. Dit is van buitenaf slechts te zien als een zwelling onder uw huid.

Het Port-a-Cath systeem bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

- Het reservoir: een kleine injectiekamer met aan de bovenkant een zelfsluitend membraan.
- De katheter: een dun flexibel slangetje wat in een bloedvat komt te liggen.

Met een injectie prikt de verpleegkundige door de huid in het kastje. Medicijnen en vloeistoffen kunnen via dit kastje in het bloedvat worden ingespoten.



Hoe wordt de Port-a-Cath geplaatst?

Het plaatsen gebeurt tijdens een kleine chirurgische ingreep. Hiervoor krijgt u een afspraak op de polikliniek chirurgie. De chirurg geeft u de informatie over de plaatsing.

- Samen wordt gekeken naar wat voor u de meest geschikte plaats is.
- Meestal wordt de Port-a-Cath geplaatst op de borstkas, net onder het sleutelbeen.
- De wijze van verdoving wordt door de chirurg samen met u bepaald. Het kan onder plaatselijke verdoving of onder volledige narcose.
- Voor het plaatsen krijgt u antibiotica toegediend om de kans op infectie te verminderen.

Na het plaatsen

Na de plaatsing van de Port-a-Cath wordt een röntgenfoto gemaakt. De röntgenfoto wordt door de chirurg bekeken om te controleren of hij goed geplaatst is. In principe mag u dezelfde dag weer naar huis. Na de plaatsing van de Port-a-Cath kan de huid gezwollen en gevoelig zijn. U mag zo nodig paracetamol tegen de pijn nemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Eenmaal onderhuids geplaatst is de Port-a-Cath direct klaar voor gebruik. Kort na de ingreep kan dit gevoelig zijn. Na verloop van tijd wordt deze pijn minder.

Mogelijke complicaties tijdens de plaatsing

Aan elke ingreep kleven risico's en dat geldt ook voor het plaatsen van een Port-a-Cath. Een enkele keer treden er complicaties op zoals:

- Een bloeditstorting rondom de plek van de ingreep.
- Een infectie.
- Pijn bij de lokale verdoving.
- Bloeding door het aanprikken van de slagader in plaats van de ader (zeldzaam).
- Klaplong door het aanprikken van de longtop (zeldzaam).

Mogelijke complicaties op langere termijn (zelden optredend)

- Moeilijk of niet aanprikken.
- Wel vloeistoffen kunnen toedienen maar geen bloed meer terug kunnen zuigen.
- Niet kunnen inspuiten, bijvoorbeeld door verplaatsing of kanteling van de poort of het afknikken van de katheter.
- Lekkage.
- Ontkoppeling tussen het kastje en katheter.

Verzorging van de Port-a-Cath

Na de plaatsing van de Port-a-Cath wordt de huid gesloten met een oplosbare hechting en speciale hechtpleisters. Deze hechtpleisters kunt u het best zo lang mogelijk laten zitten. Ze laten na ongeveer vier weken vanzelf los. Met deze hypoallergene Suturestrip hechtpleisters mag u meteen douchen. Na elke behandeling wordt de poort en de katheter met een heparine-oplossing doorgespoeld om te voorkomen dat het systeem verstopt raakt. Deze spoeling met heparine moet minstens eenmaal per vier weken worden uitgevoerd. Als het systeem

helemaal niet meer gebruikt wordt, kan het eenvoudig onder plaatselijke verdoving worden verwijderd. Dit is veel minder belastend dan het inbrengen en dit kan vaak poliklinisch gebeuren.

Mogelijke problemen met de Port-a-Cath

Hieronder vindt u een lijstje met symptomen die kunnen voorkomen. Als een van deze symptomen optreedt, of als er zich andere symptomen voordoen, neem dan contact met uw medisch specialist op.

- Ongemak, zwelling of pijn in de schouder, nek, hals of arm.
- Pijn of roodheid op of rondom de plaats van de poort.
- Koorts.

Hoelang kan een Port-a-Cath blijven zitten?

Over het algemeen blijft de Port-a-Cath vele jaren zitten.

Zijn er lichamelijke beperkingen?

Waarschijnlijk zult u nauwelijks hinder hebben van de Port-a-Cath. Zijn de wondjes van het inbrengen genezen, dan zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig en kunt u alles doen. Wanneer de Port-a-Cath is aangesloten op een infuus, dan wordt het aanprikpunt ter bescherming afgeplakt. U kunt met een Port-a-Cath gewoon door het beveiligingspoortje in de winkel en op de luchthaven. Ook zwemmen, baden en douchen zijn geen probleem. U kunt gewoon een MRI-scan laten maken, ondanks het feit dat de Port-a-Cath van metaal is gemaakt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw medisch specialist of via onderstaand telefoonnummer met uw oncologieverpleegkundige:

Oncologieverpleegkundige

- 088 708 3564

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.