

Het verloop van de irinotecan/capecitabine kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **Irinotecan**
2. **Capecitabine (=Xeloda)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							

Wijze van toediening:

Het medicijn irinotecan wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. U krijgt voor de chemokuur medicatie in de vorm van een onderhuidse injectie toegediend om bijwerkingen tegen te gaan. De toediening duurt ongeveer anderhalf uur. De capecitabine kunt u zelf innemen, want dit zijn tabletten. U start hiermee op de avond van dag één en gaat hiermee door t/m de ochtend van dag vijftien. De kuur wordt afhankelijk van de bloeuitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5 ° C moet u contact met ons opnemen.
- Als meest voorkomende bijwerking kan diarree optreden. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan vier keer daags diarree heeft, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op uw ontlastingpatroon. De behandeling van diarree kan obstipatie (verstopping) als gevolg hebben.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee a drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint vaak met een pijnlijke hoofdhuid. In enkele gevallen kan de haaruitval acuut optreden. Een machtiging voor een eventueel haarwerk kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Pijnlijke gezwollen handen en/of voeten, hiervoor kunt u vier maal daags bodylotion/handcrème of 10% ureumzalf gebruiken. Probeer knellende kleding en schoenen zoveel mogelijk te vermijden.
- Stomatitis: als de mond en/of keel pijnlijk, rood of gezwollen is of als u kapotte plekjes en zweren in de mond heeft. Goede mondverzorging en vier maal per dag spoelen met een zoutoplossing of kamille-/groene thee kan deze klachten al zoveel mogelijk voorkomen
- Resten cytostatica kunnen tot dag 18 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 [facebook.com/zgtinfo](https://www.facebook.com/zgtinfo)

 [linkedin.com/company/zgt](https://www.linkedin.com/company/zgt)

 twitter.com/zgt_info

 [youtube.com/user/zgtinfo](https://www.youtube.com/user/zgtinfo)

Wijze van inname capecitabine:

- Neem de capecitabine in met een interval van 12 uur.
- Neem de capecitabine in binnen een half uur na iets gegeten te hebben.
- Slik de capecitabine zonder te kauwen in zijn geheel door met water
- Als u om medische redenen de tabletten niet heel kunt doorslikken dan kunnen de tabletten bij uitzondering en in overleg met en na instructie door uw specialist en apotheker worden vergruisd en/of worden opgelost.
- Als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, neem dan eerst contact op met uw behandelend specialist.
- Neem vergeten dosering niet alsnog in en verdubbel een volgende dosering niet. Volg het normale behandelingschema en stop op de oorspronkelijke stopdatum.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.