

Longfunctie

Met behulp van dit onderzoek kan de functie van de longen worden onderzocht. Er wordt onder andere gekeken naar de inhoud van de longen en de hoeveelheid lucht die er maximaal uitgeblazen kan worden. Dit onderzoek zal ongeveer een half uur gaan duren.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een mondstuk in de mond waarmee u verbonden bent met een meetapparaat dat de ademhaling zal registreren. Tevens krijgt u een klemmetje op de neus waardoor voorkomen wordt dat de lucht via de neus in- of uitgeademd kan worden.

Het is de bedoeling dat u een aantal oefeningen gaat blazen.

Als eerste wordt gekeken naar uw normale ademhaling, en vervolgens naar de hoeveelheid lucht die u bij maximale kracht ineens kunt uitblazen.

Nadat u deze oefeningen heeft geblazen krijgt u van de longfunctielaborant(e) een medicijn voor de longen dat moet worden ingeademd. Na ± 10 minuten blaast u de oefeningen nog eens om te kijken of de medicijnen een eventuele verbetering van het resultaat laten zien.

Vorbereidingen thuis

Het is belangrijk dat u zo ontspannen mogelijk aan de test begint, dus kom bijtijds. U wordt verwacht op polikliniek allergologie, route 2.11. Wanneer u longmedicatie gebruikt dient u deze voor het onderzoek te staken (zie medicijnlijst z.o.z.).

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u via uw behandelend specialist. Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek allergologie ZGT. Deze kunt u bereiken op telefoonnummer 088 708 52 30.

Afspraak

Er is voor u een afspraak bij de polikliniek allergologie gemaakt op:

..... dag ... / ... / ...

..... uur

en bij dr Miesen / dr. Ossekoppele

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Medicijnenlijst t.b.v. longfunctie

Longmedicatie

72 uur van te voren staken

Montelukast
Singulair

Longmedicatie

48 uur van te voren staken

Theofylline
Theolair retard

Longmedicatie

24 uur van te voren staken

Airflubo	Oxis
Airflusal	Revlar
Anoro	Salflutin
Aectura	Salufer
Atimos	Salmeterol
Bevespi	Seretide
Bricanyl retard	Serevent
Bufoler	Spiolto
Busalair	Spiriva
Cromoglicinezuur	Symbicort
Duoresp	Tilade
Duaktir-genuair	Tiotropium
Enerzair	Tavulus
Flutiform	Tiotrus
Foradil	Trixeo
Formoterol	Trimbow
Foster	Tregely
Indaceterol=Hirobriz, Onbrez	Umeclidinum=Incruse
Lomudal	Ultibro
Nedocromil	Xoterna
Olodateol=Striverdy	

Longmedicatie

8 uur van te voren staken

Aerolin	Fenoterol
Airomir	Ipramol
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Salamol
Berotec	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Bronchodual	Ventolin
Combivent	

Medicatie tegen hoesten

72 uur van te voren staken

Oxomemazine
Toplexil