

Hoe gaat de behandeling van de nivolumab / ipilimumab / paclitaxel / carboplatin kuur

U begint met een combinatietherapie bestaande uit chemotherapie en immunotherapie. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **Carboplatin** (chemotherapie)
2. **Paclitaxel** (chemotherapie)
3. **Ipilimumab** (immunotherapie)
4. **Nivolumab** (immunotherapie)

Verloop

De kuur krijgt u om de zes weken. De eerste kuur bestaat uit immunotherapie in combinatie met chemotherapie. Vanaf de tweede kuur krijgt u alleen nog immunotherapie.

1 ^e kuur dag 1	Carboplatin / Paclitaxel Ipilimumab / Nivolumab
1 ^e kuur dag 22	Carboplatin / Paclitaxel Nivolumab
2 ^e kuur en verder dag 1	Ipilimumab / Nivolumab
2 ^e kuur en verder dag 22	Nivolumab

Manier van toedienen:

U krijgt de medicijnen via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling gebeurt op de dagbehandeling oncologie van ZGT Hengelo. Om te zorgen dat u geen allergische reactie krijgt op paclitaxel krijgt u vooraf medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige. De totale toediening duurt ongeveer vier uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen. Deze klachten kunnen een aantal dagen duren. Wanneer het nodig is mag u maximaal 4 keer per dag 1000 mg paracetamol innemen.

- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee tot drie weken na de eerste behandeling. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Wanneer u een pruik wilt kunt u hiervoor een machtiging vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag even melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Resten chemotherapie kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

De bijwerkingen van ipilimumab/nivolumab staan in de bijgeleverde folder en waarschuwingskaart.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.