

Het verloop van de FEC kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **F**luorouracil
2. **E**pirubicine
3. **C**yclofosfamide

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
F																				
E																				
C																				

Manier van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Dit gebeurt op de dagbehandeling oncologie van ZGT. De toediening duurt ongeveer anderhalf uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee à drie weken na de eerste toediening. Haarruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid.
- Door epirubicine is tot enkele dagen na de kuur, rood verkleuring van de urine en soms het traanvocht mogelijk. Dit is onschuldig. Het kan mogelijk aanleiding geven tot verkleuring van contactlenzen. Het is daarom aan te raden deze de eerste 48 uur na toediening niet te dragen.
- Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het is daarom van belang dat u gedurende de eerste dagen na de toediening veel drinkt (anderhalf tot twee liter)
- Resten cytostatica kunnen tot dag zeven in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.