

## Borstsparende operatie bij borstkanker (lumpectomie), in dagbehandeling

In deze folder vindt u aanvullende informatie over deze operatie. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend specialist dit aan u uit.

### Preoperatieve screening

Nadat u met de chirurg heeft besproken dat u geopereerd gaat worden, brengt u een bezoek aan de POS (preoperatieve screening). Dit is een polikliniek waar de anesthesioloog vóór de operatie met u bespreekt op welke manier u tijdens de ingreep wordt verdoofd. De ingreep die u binnenkort ondergaat vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose) en tevens een pijn block. Hij/zij onderzoekt u om mogelijke operatierisico's in te schatten. Ook kan het zijn dat u nog enkele onderzoeken moet ondergaan, zoals een ECG (elektrocardiogram of hartfilmpje), longfoto of bloedonderzoek.

Het is ook mogelijk dat u op advies van de anesthesioloog wordt verwezen naar de cardioloog, internist of longarts. Op de POS krijgt u ook informatie over de voorbereidingen rondom de ingreep. Tijdens dit bezoek kunt u vragen stellen over de manier van pijnbestrijding na de ingreep. Ook het gebruik van uw medicijnen en regels ten aanzien van nuchter zijn rondom de operatie worden met u doorgenomen. Neem altijd en actueel medicatieoverzicht mee. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.

### De opnameperiode

De operatie vindt plaats in dagbehandeling in ZGT locatie Hengelo. U wordt op de dag van de operatie opgenomen op de afdeling: 'OK opname', route 1.17. Op de dag van opname meldt u zich bij de receptie in het ziekenhuis. Vervolgens brengt een gastvrouw u naar de afdeling.

Als bij u op de dag van de operatie de schildwachtklier/poortwachtklier nog opgespoord moet worden gaat u eerst naar de polikliniek nucleaire geneeskunde. Meestal vindt dit onderzoek een dag tevoren plaats.

### Het ziekenhuisverblijf

Op de opnamedag heeft u een gesprek met de verpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de gang van zaken op de afdeling. De verpleegkundige brengt u naar de opnamekamer en vertelt u hoe laat de operatie ongeveer plaatsvindt. Tevens zal de voorbereiding op de operatie ook op deze kamer gebeuren. U krijgt hier een infuus ingebracht en u wordt aangesloten op de hartbewaking (monitor). Van hieruit wordt u met bed naar de operatiekamer gebracht. Via het infuus worden anesthesiemiddelen ingespoten. Deze middelen werken zeer snel. U wordt volledig verdoofd en valt tijdelijk in een diepe slaap (narcose).

### Vorbereiding op de operatie

De ingreep vindt plaats in dagbehandeling. Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit is van groot belang voor de operatie. U ontvangt hiervoor een aparte folder met instructies. U mag geen make-up gebruiken en sieraden moet u afdoen. Op de afdeling krijgt u een speciaal operatiejasje aan. Uw onderbroek mag u aanhouden. Een eventuele gebitsprothese mag u in eerste instantie inlaten, deze kan zo nodig op het laatste moment voor de operatie alsnog verwijderd worden. Gehoorapparaten mag u inlaten.

#### Almelo

Zilvermewu 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt)

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 [facebook.com/zgtinfo](https://facebook.com/zgtinfo)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [twitter.com/zgt\\_info](https://twitter.com/zgt_info)


 [youtube.com/user/zgtinfo](https://youtube.com/user/zgtinfo)

## De operatie

Bij een borstsparende operatie wordt de kwaadaardige tumor en een gedeelte gezond weefsel rondom de tumor verwijderd. Een borstsparende operatie is alleen mogelijk als de tumor niet te groot is ten opzichte van de borst en maar op één plaats in de borst aanwezig is. Tegelijk met de verwijdering van de tumor uit de borst, worden ook klieren uit de oksel verwijderd. Er zijn hierbij twee verschillende operaties mogelijk.

1. Het schildwachtklieronderzoek (ook wel poortwachterklier of sentinel node genoemd): Hierbij worden meestal één, soms meerdere klieren weggenomen, die onderzocht worden op mogelijke uitzaaiingen. Als dit bij u nodig is, legt uw chirurg dit aan u uit.
2. Okselklierdissectie: Hierbij worden alle klieren in de oksel weggenomen en onderzocht op mogelijke uitzaaiingen.

Uw chirurg bespreekt met u welke operatie voor u de beste keuze is en u krijgt hierover een aparte folder.



## Lokalisatie

Als de tumor bij u niet voelbaar is, bepaalt de radioloog eerst de juiste plaats van de tumor, voordat u wordt geopereerd. Hierbij wordt tijdens echo-onderzoek vastgesteld waar de tumor zich bevindt. Op die plaats wordt dan een radioactief jodiumzaadje ingebracht. De chirurg kan zo de plaats van de tumor vinden tijdens de operatie. Als dit bij u nodig is, legt uw chirurg dit aan u uit en krijgt u hierover een aparte folder.

## Bestraling

Een borstsparende operatie wordt bijna altijd gevolgd door bestraling. Meer informatie hierover staat in de brochure die u krijgt van de radiotherapeut (bestralingsarts).

Voor en na de borstsparende operatie heeft u een gesprek met de radiotherapeut. Hij/zij bespreekt met u hoe, waar, hoe vaak en wanneer de bestraling plaatsvindt. En waarop u in de bestralingsperiode moet letten.

De bestraling start ongeveer vier tot zes weken na de operatie. Over het algemeen wordt u gedurende meerdere weken bestraald. De bestralingen zelf duren maar enkele minuten. Bestraling geeft meestal weinig klachten. U kunt zich iets vermoeider voelen in de periode dat u bestraald wordt. Ook kunnen er plaatselijk huidreacties (roodheid en irritatie) optreden en kan uw borst tijdelijk wat voller en gevoeliger zijn. De huid gaat meestal niet kapot.

## Na de operatie

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Na de operatie kunt u zich nog slaperig voelen. Als u goed wakker bent, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Het is belangrijk dat u de verpleegkundige eerlijk laat weten of en hoeveel pijn u heeft. Op die manier kunnen we de pijnmedicatie, als dat nodig is, op tijd aanpassen. Wanneer u terug bent op de verpleegafdeling wordt uw naaste, de contactpersoon die bij ons bekend is, hierover geïnformeerd.

## Risico's/complicaties

Iedere operatie geeft een kleine kans op complicaties. De complicaties die eventueel op kunnen treden:

- Nabloeding, deze kan direct na de operatie ontstaan, waardoor er eventueel opnieuw een operatie nodig is.
- Infectie.

- Ophoping van heldere vloeistof in de wond (seroom).
- Beperkte beweging van de arm en schouder.
- Pijn na de operatie (branderig gevoel, stekende pijn in de borst op de plek van de operatie).

We nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze complicaties te voorkomen.

### Ontslag

Het is belangrijk is dat u niets forceert t.a.v. het operatiegebied. Houd na uw ontslag rekening met het volgende:

- *Douchen*. Douche liever niet te lang en te warm. Probeer de eerste dagen niet de volle douche op het wondgebied te zetten, i.v.m. pijn en te snel loslaten van de hechtingpleisters. Wees matig met douche-crème bij de wond i.v.m. irritatie en/of pijn. Wij adviseren u de wond met een zachte handdoek droog te deppen.
- *Baden, zwemmen of sauna*. Baden, zwemmen of sauna kan pas nadat u voor controle op de polikliniek bent geweest.
- *Pleisters*. Verwijder de pleisters niet zelf, deze blijven in principe twee tot vier weken zitten. Ze kunnen wel eerder loslaten. Wanneer de pleisters loslaten hoeven ze niet meer vervangen te worden, knip dan de loszittende stukjes eraf.
- *Hechtingen*. De hechtingen zijn oplosbaar. Deze hoeven dus niet verwijderd te worden.
- *Mobiliseren*. Blijf liever niet te veel in bed liggen. U kunt uw armen op geleide van de pijn bewegen. Dus alleen meer bewegen wanneer het geen pijn doet. Tot de eerstvolgende poliafspraak raden wij u aan om niets te forceren. Dus niet zwaar tillen, geen zwaar huishoudelijk werk en niet sporten. Autorijden wordt afgeraden totdat u het stuur weer optimaal kunt hanteren. Probeer uw conditie weer op

te bouwen door bijvoorbeeld te gaan wandelen.

- *Polikliniekafpraak*. Ongeveer tien tot veertien dagen na de operatie wordt u bij ons op de polikliniek verwacht voor de uitslag van het weefselonderzoek.

### Ondersteuning

Voor uw herstel is het belangrijk dat u beweegt (op geleide van pijn). U krijgt hiervoor oefeningen mee voor thuis, zodat uw arm/schouderfunctie optimaal blijft.

Verder kunt u, als u dat wenst, een beroep doen op hulp van een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijke verzorging. Zij staan voor u klaar om u te ondersteunen bij het omgaan met uw nieuwe situatie. Wilt u hier meer over weten, vraag er dan naar bij de mammacare-verpleegkundige in het borstcentrum.

### Contact opnemen

Neemt u contact op bij:

- Koorts (38,5 of hoger)
- Nabloeding
- Zwelling
- Aanhoudende pijn

Tijdens kantoortijden:

Secretariaat Borstkliniek Oost-Nederland, telefoonnummer 088 708 52 32.

Buiten kantoortijden:

De afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

### Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Borstkliniek Oost-Nederland. Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 – 12.30 uur en tussen 13.30 – 16.30 uur op telefoonnummer 088 708 52 32. U mag ons ook mailen; [mammapoli@zgt.nl](mailto:mammapoli@zgt.nl)

### Lees ook

- [www.borstkliniekoostnederland.nl](http://www.borstkliniekoostnederland.nl)
- [www.borstkanker.nl](http://www.borstkanker.nl)

### **Check uw dossier op MijnZGT**

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt).