

Iloprost (ilomedine) infuus bij reumatische aandoeningen

Uw reumatoloog heeft samen met u besloten tot behandeling met een iloprost infuus. Het is verstandig dat u deze informatiefolder goed doorleest voordat de behandeling van start gaat.

Het effect van iloprost

Iloprost is een medicijn dat bloedvat-vernauwende eigenschappen heeft en het vastplakken van de bloedplaatjes aan de vaatwand remt. Wanneer het wordt gebruikt bij ziekten die gepaard gaan met bloedvatvernauwing dan kan het de bloeddorstroming (zoals van handen en voeten) bevorderen. Iloprost wordt onder andere toegepast bij het fenomeen van Raynaud (bijvoorbeeld bij sclerodermie/systemische sclerose), bloedvatontsteking (vasculitis) en zweertjes (digitale ulcera) aan vingers, tenen of elders op de huid bij patiënten met systemische sclerose en systemische lupus erythematoses. Het effect van de behandeling kan direct optreden maar ook meerdere dagen op zich laten wachten. U merkt dan dat de aangedane plekken warmer worden en/of rood verkleuren. Een deel van de behandelde patiënten bemerkt helaas geen positief effect van iloprost.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen kunnen optreden.

Meest voorkomend

- Gevoel van opvliegers met warmtesensatie.
- Blozen en roodheid van de hals en nek.
- Zweten.
- Hoofdpijn.
- Duizeligheid.
- Misselijkheid en braken.

Soms/zelden voorkomend:

- Sterke daling van de bloeddruk.
- Snellere of tragere hartslag dan normaal.
- Pijn op de borst.
- Pijn in handen en voeten waarvoor de behandeling bedoeld is.

- Bloeding.

Wijze van toediening

Voor een iloprost infuus wordt u meestal gedurende vijf (soms drie) dagen opgenomen op de afdeling reumatologie. Wanneer u op de afdeling bent aangekomen wordt een infuus ingebracht en begint de behandeling. Het iloprost infuus wordt zes uur per dag toegediend. Gedurende deze zes uur dient u aanwezig te blijven op de afdeling. Hierna wordt de medicijnvloeistof van het infuus losgekoppeld.

De eerste drie dagen wordt de hoeveelheid iloprost opgebouwd tot de gewenste dosering bereikt is. Deze dosering is afhankelijk van de bijwerkingen en kan per patiënt verschillen. Daarom is het belangrijk dat u aangeeft of u bijwerkingen heeft en of deze draaglijk zijn. Op dag vier en vijf start de verpleging het infuus direct op de gewenste dosering. Tijdens de toediening van iloprost controleert de verpleging regelmatig uw bloeddruk / pols en wordt u gevraagd hoe u zich voelt. Mocht u vervelende bijwerkingen ervaren, laat dit dan aan de verpleging weten. Bij milde bijwerkingen wordt de iloprost dosering meestal (tijdelijk) verlaagd. Mocht u ernstige bijwerkingen hebben dan wordt het infuus tijdelijk of definitief gestaakt. Wij doen ons best om het u zo aangenaam mogelijk te maken.

Wanneer mag u geen iloprost toegediend krijgen?

- Tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
- Bij aandoeningen met een groot risico op bloedingen zoals een maagzweer of een recente bloeding in het hoofd.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Behandeling wordt afgeraden bij recente hartaandoeningen zoals een hartinfarct, (ernstige) hartritmestoornissen, verminderde hartwerking (hartfalen).

Waarschuwingen:

- Het is van groot belang dat u niet rookt. Roken kan het effect van iloprost ongedaan maken.
- Iloprost vermindert de werking van de bloedplaatjes. Het is verstandig om tijdens de behandeling met iloprost tijdelijk geen NSAID's te gebruiken. NSAID's zijn pijnstillers met ontstekingsremmende werking zoals naproxen, diclofenac en ibuprofen. Overleg hierover met uw reumatoloog.
- Gebruikt u bloedverdunners of bloeddrukverlagende / vaatverwijdende medicijnen? Overleg vóór het infuus met uw reumatoloog of u deze tijdelijk moet stoppen of hiermee door mag gaan tijdens de behandeling met iloprost.
- Nadat u het laatste iloprost infuus gehad heeft kunt u meestal nog dezelfde dag naar huis. Uw arts zal u instrueren welke (bloeddrukverlagende / vaatverwijdende) medicijnen u mag herstarten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw reumatoloog of bezoek onze website.

Telefoonnummer polikliniek reumatologie:

- 088 708 34 03

Website afdeling reumatologie:

- zgt.nl/reumatologie

Disclaimer

Deze patiëntfolder is een verkorte versie van de officiële bijsluiter en vervangt deze niet.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.