

Het verloop van de Paclitaxel / Bevacizumab kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **Paclitaxel** (=Taxol)
2. **Bevacizumab**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
P							P							P													
B														B													

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT.

Om een allergische reactie op paclitaxel te voorkomen krijgt u vooraf via het infuus medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige. De totale behandeling duurt gemiddeld drie uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen drie keer wekelijks gegeven, gevolgd door een week rust.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal 3 a 6 weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventueel haarwerk kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Door de bevacizumab kan uw bloeddruk stijgen. Uw bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd.
- Spierpijn en/of gewrichtspijn is een veel voorkomende bijwerking die over het algemeen twee tot drie dagen na het infuus optreedt. U mag hiervoor zondig maximaal vier maal daags 1000mg paracetamol innemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen en/of vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Resten cytostatica kunnen tot dag drie in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

De bijwerkingen van de Bevacizumab staan beschreven in de bijgeleverde folder.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.