

Medicijnhuidtest

Algemeen

Met behulp van deze test kan worden nagegaan of u allergisch bent voor

.....

Dit onderzoek zal duren.

Verloop van het onderzoek

Huidpriktest

Deze test vindt plaats met behulp van een vloeistof waarin het te testen medicijn is opgelost. De vloeistof wordt op de binnenkant van uw onderarm of op uw rug gedruppeld. Met een klein lancet wordt de huid aangeprikt, zodat de vloeistof net onder de huid contact kan maken. Na ongeveer 15 minuten kan de uitslag van de test worden bekeken. Mocht u niet, of niet voldoende hebben gereageerd dan wordt deze procedure herhaald met een steeds hogere concentratie van het medicijn. Wanneer u reageert zal er een iets jeukende, rode uitslag ter plaatse ontstaan. Deze zal overigens snel weer wegtrekken. Wanneer u niet, of niet voldoende heeft gereageerd tijdens de huidpriktest wordt er verder gegaan met de intracutane test.

Intracutane huidtest

Deze test vindt plaats met behulp van vloeistof waarin het te testen medicijn is opgelost. De vloeistof wordt met behulp van kleine injecties in de huid gespoten. Na ongeveer 15 minuten kan de uitslag worden bekeken. Mocht u niet, of niet voldoende hebben gereageerd dan wordt deze procedure herhaald in een steeds hogere concentratie van het medicijn. Wanneer u reageert zal er een iets jeukende, rode uitslag ter plaatse ontstaan. Deze zal overigens snel weer wegtrekken.

Vorbereidingen thuis

- Medicijnen tegen allergie en enkele antidepressiva dienen 72 uur van te voren worden gestaakt (zie medicijnlijst z.o.z.), altijd vooraf overleg met de allergoloog.
- Bètablokkers: 48 uur van te voren staken, altijd na overleg met de allergoloog
- Gebruik geen bodylotion en dergelijke op onderarmen of rug.

Uitslag

Uw behandelend medisch specialist deelt u de uitslag van het onderzoek mee.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tijdens kantooruren kunt u ook contact opnemen met de polikliniek allergologie, telefoonnummer 088 708 52 30.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Medicijnenlijst t.b.v. allergietest

Medicijnen tegen allergie en jeuk 72 uur van te voren staken

Acrivastine	Lomudal
Aerius	Loratadine
Alimemazine	Mebhydroline
Allerfre	Mizolastine
Allergodil (Azelastine)	Mizollen
Atarax	Montelukast
Cetirizine	Nalcrom
Ciclosporine	Nedeltran
Claritine	Neoral
Clemastine	Oxatomide
Cromoglicinezuur	Periactin
Cyproheptadine	Polaramine
Desloratadine	Prevalin
Dexchlorfeniramine	Promethazine
Dimetindeen	Reactine
Dymista	Semprex
Ebastine	Singulair
Fenistil	Tavegil
Fexofenadine	Telfast
Hydroxyzine	Terfenadine
Kestine	Tinset
Ketotifen	Xyzal
Levocetirizine	Zaditen
Livocab (Levocabastine)	Zyrtec

Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid 72 uur van te voren staken

Betahistine	Emesafene
Betaserc	Meclozine
Chloorcyclizine/ cinnarizine	Meclozine/pyridoxine
Cinnarizine	Primatour
Cyclizine	Suprimal

Antidepressiva

72 uur van te voren staken, altijd na overleg met de allergoloog

Amitriptyline	Prothiaden
Anafranil	Quetiapine
Clomipramine	Remeron
Dosulepine	Sarotex
Doxepine	Seroquel
Maprotiline	Sinequan
Mianserine	Tolvon
Mirtazapine	Trazodon
Nortrilen	Trazolan
Nortriptyline	Tryptizol

Bètablokkers

48 uur van te voren staken, altijd na overleg met de allergoloog

Acebutalol	Metoprolol
Atenolol	Nebilet
Bisoprolol	Nebivolol
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorm	Propranolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

Maag/darm medicijnen

72 uur van te voren staken

Axid	Pepcidin
Cimetidine	Ranitidine
famotidine	Tagamet
Nizatidine	Zantac
Pepcid	