

Trastuzumab

U start binnenkort met een behandeling met trastuzumab. Trastuzumab is een doelgerichte therapie. Meer informatie over doelgerichte therapie vindt u op kanker.nl. In deze folder leest u meer over de behandeling met trastuzumab. Trastuzumab kan alleen gegeven worden of in combinatie met andere medicijnen

Wat is trastuzumab?

Trastuzumab is een doelgerichte therapie. Bij doelgerichte therapie krijgt u medicijnen om kankercellen te doden of de groei ervan te remmen. Trastuzumab blokkeert het eiwit Her-2. Dit eiwit zit bij bepaalde tumoren op de celwand van de kankercellen. Her-2 zorgt voor groei van de tumorcellen. Trastuzumab blokkeert dit, waardoor de kankercellen stoppen met groeien en afsterven.

Manier van toediening

U krijgt trastuzumab via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling gebeurt op de dagbehandeling oncologie in ZGT Hengelo. De eerste keer duurt deze behandeling anderhalf uur. Daarna blijft u nog vier en een half uur in het ziekenhuis. Zo kunnen onze zorgprofessionals erop letten dat u goed op het infuus reageert. De meeste bijwerkingen op dit medicijn gebeuren namelijk tijdens of direct na het eerste infuus.

Heeft u geen bijwerkingen gehad? Dan duren de volgende behandelingen iedere keer een half uur. Bij de eerste kuur krijgt u een oplaaddosis. Hierbij krijgt u een hogere hoeveelheid medicijn dan bij de volgende kuren. Het aantal kuren en een combinatie met andere medicijnen kan per soort behandeling verschillen. Uw medisch specialist informeert u hierover.

Mogelijke bijwerkingen

- U kunt een allergische reactie krijgen. Hierbij kunt u last krijgen van koorts, benauwdheid, rillingen, huiduitslag en bloeddrukverlaging. Deze reacties kunnen vooral bij de eerste keer dat u dit infuus krijgt voorkomen.
- De eerste dagen na de behandeling kunt u griepachtige klachten hebben. Zoals: lichte koorts, hoofdpijn, spierpijn en pijnlijke gewrichten. Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf. Wanneer nodig kunt u paracetamol innemen, maximaal vier keer per dag 1000mg.
- Uw hartspier kan minder goed werken. Voor de behandeling wordt uw hartspier onderzocht met een scan. Zo nodig herhalen we deze scan tijdens de behandeling.
- Vermoeidheid.

Waarschuwingen

Neem contact met ons op wanneer:

- U koorts krijgt boven de 38,5°.
- U klachten krijgt die u niet vertrouwt.

Heeft u vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend medisch specialist, verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige.

Dagbehandeling oncologie ZGT:

- 088 708 35 64

Buiten kantoortijden via afdeling 5 west/oncologie:

- 088 708 34 20

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.