

## Het verloop van de CHOP kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.

1. **C**yclofosfamide
2. **H**ydroxydaunomycine (=Doxorubicine)
3. **O**ncovin
4. **P**rednisolon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C																				
H																				
O																				
P	P	P	P	P																

### Wijze van toediening:

Cyclofosfamide, hydroxydaunomycine en oncovin worden u toegediend via een infuus in een ader in uw arm of hand. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. De toediening duurt ongeveer anderhalf uur. Prednison kunt u zelf thuis innemen, want dit zijn tabletten. U begint hiermee op de ochtend van de chemokuur en slikt dit elke kuur vijf dagen achter elkaar. De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de drie weken gegeven.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is tijdelijke en begint meestal twee tot drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid.
- Door hydroxydaunomycine is tot enkele dagen na de kuur rode verkleuring van de urine en soms het traanvocht mogelijk. Dit is ongevaarlijk. Het kan zorgen voor verkleuring van contactlenzen. Het is daarom aan te raden deze de eerste achtenveertig uur na toediening niet te dragen.
- Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het is daarom van belang dat u gedurende de eerste dagen na de chemokuur veel drinkt (anderhalf tot twee liter).
- Door oncovin is obstipatie (verstopping) na de kuur mogelijk.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.
- Prednison kan de opname van suiker in uw lichaam verstoren. Door prednison kan uw uiterlijk tijdelijk veranderen, bijvoorbeeld een blozend gezicht. Door prednison kunt u een opgejaagd gevoel krijgen en uw stemming kan wisselen.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [zgt.nl/mijnzgt](mailto:zgt.nl/mijnzgt)

 [zorgkaart http://bit.ly/1y7WjbP](http://bit.ly/1y7WjbP)

 [facebook.com/zgtinfo](https://www.facebook.com/zgtinfo)

 [linkedin.com/company/zgt](https://www.linkedin.com/company/zgt)

 [twitter.com/zgt\\_info](https://twitter.com/zgt_info)

 [youtube.com/user/zgtinfo](https://www.youtube.com/user/zgtinfo)

- Resten cytostatica kunnen tot dag zeven in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

**Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.**

### **Check uw dossier op MijnZGT**

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt).