

Het verloop van cetuximab en encorafenib

U begint met een kuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. Cetuximab
2. Encorafenib

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C	E	E	E	E	E	E	C	E	E	E	E	E	E	C	E	E	E	E	E	E	C
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

Manier van toediening

De middelen die u krijgt zijn cetuximab (infuus) en encorafenib (tabletten). Cetuximab is een monoklonaal antilichaam. Dit is een stof, die andere unieke eiwitten in het lichaam herkent en hieraan hecht. Op deze manier remt het onder andere de signalen die zorgen voor de groei van de kankercellen. In uw tumor is er een verandering in het BRAF-gen. Veranderingen (mutaties) in het BRAF-gen kunnen eiwitten produceren die ervoor zorgen dat de kanker groeit. Encorafenib richt zich op eiwitten gemaakt uit dit veranderde BRAF-gen en draagt er op die manier aan bij dat de kankercel niet kan groeien.

U krijgt cetuximab via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling gebeurt op de dagbehandeling oncologie van ZGT.

Vóór de toediening van cetuximab krijgt u medicijnen via het infuus om misselijkheid, braken en overgevoelighedsreacties te voorkomen.

Cetuximab wordt wekelijks gegeven. Encorafenib is een capsule en dit neemt u eenmaal per dag in, 300mg (vier capsules van 75mg).

Aandachtspunten cetuximab

- Bij koorts boven de 38,5°C moet u contact met ons opnemen.
- Huidreactie (zeer vaak); de reactie bestaat meestal uit roodheid, een acné-achtige uitslag in het gezicht en op het bovenlijf en/of jeuk. De huidreactie treedt meestal binnen een week na toediening op. Meldt deze bijwerking op tijd zodat er medicatie en/of zalf voorgeschreven kan worden.
In zeldzame gevallen kunnen zich ook zeer ernstige huidreacties voordoen, die levensbedreigend kunnen zijn, en waarvoor een passende behandeling onmiddellijk gestart moet worden.
- Schilferige droge huid.
- Nagelafwijkingen; ontsteking van het nagelbed, pijnlijke gevoelige nagel en/of scheurtjes.
- Uw hartslag, bloeddruk, temperatuur en ademhaling worden tijdens toediening regelmatig gecontroleerd i.v.m. het risico op een allergische reactie. Na de toediening blijft u nog ongeveer een uur in het ziekenhuis ter controle.

- Hoesten, kortademigheid.
- Vocht vasthouden (oedeem).
- Irritatie van de (mond)slijmvliezen, kan leiden tot een bloedneus. Indien deze langer dan 15min aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw medisch specialist of verpleegkundig specialist.

Aandachtspunten encorafenib

- Tijdens de gehele behandeling mag u geen grapefruit of kruisingen van grapefruit met een andere citrusvrucht (Sevilla sinaasappelen, mineola, pompelmoes) gebruiken. Deze producten zorgen ervoor dat encorafenib minder goed werkt.
- U kunt last krijgen van een dof, dood gevoel in vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit komt door een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg. Het kan zijn dat u, wanneer u meer kuren krijgt, steeds meer last krijgt van deze bijwerking. Soms zijn deze klachten de hele tijd aanwezig. Heeft u hier last van? Meld dit dan bij een volgend polibezoek. We kunnen niets doen om de bijwerking te voorkomen, maar we kunnen wel kijken hoe we verergering kunnen voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door een aanpassing van de dosering van de kuur.
- Verminderd zicht.
- Trombose.
- De anticonceptiepil heeft een verminderde werking door het gebruik van encorafenib.
- Ontstaan van nieuwe moedervlekken, of, in zeldzame gevallen meestal goedaardige, huidtumoren.

Gebruiksaanwijzing encorafenib

- Neem de capsules steeds rond hetzelfde tijdstip in
- Slik de capsules in zijn geheel, zonder te kauwen, door met water
- Als u een dosis bent vergeten: niet meer innemen als de volgende dosis over minder dan 12 uur moet worden ingenomen. Verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema.
- Indien u braakt na inname van de capsules, neem dan niet onmiddellijk opnieuw capsules in. Meld het aan uw behandelend medisch specialist of verpleegkundig specialist als u moet braken. U kunt medicatie tegen de misselijkheid krijgen. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.