

Allopurinol

bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Allopurinol. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van Allopurinol en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht.

Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten weer terugkomen.

Werking

Uw behandelend arts heeft u eerder azathioprine (Imuran®) of mercaptopurine (Puri-nethol®) voorgeschreven. Hierbij blijkt dat er bij u onvoldoende spiegel van het medicijn kan worden opgebouwd doordat dit in uw lichaam wordt omgezet in een afbraakproduct. Dit kan gecorrigeerd worden door toevoeging van het middel Allopurinol, een medicijn wat vooral bij de behandeling van jicht wordt toegepast. Door gelijktijdig gebruik van Imuran®/Puri-Nethol® en Allopurinol stijgt de spiegel en daalt het afbraak product. Doordat Allopurinol de afbraak van Imuran®/Purinetho® beïnvloedt moet de dosis van deze middelen worden verlaagd. Tevens dient net als bij het starten van Imuran®/Puri-Nethol® het bloed na toevoeging van Allopurinol in de eerste weken extra gecontroleerd te worden. Daarnaast kan Allopurinol bijwerkingen geven.

Gebruik en Doseringen

Allopurinol is verkrijgbaar in tabletvorm. De voorgeschreven dosering moet zeer strikt aangehouden worden. De dosering van Imuran®/Puri-Nethol® moet altijd worden aangepast. Over het algemeen wordt het gebruik van allopurinol goed verdragen.

Wanneer innemen

De tabletten innemen na de maaltijd (om maag-darmstoornissen te voorkomen).

Bijwerkingen

Bijwerkingen die bij Allopurinol voorkomen zijn:

Vaak (1-10%):

Allergische huidreacties zoals huiduitslag.

Soms (0,1-1%):

Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken (te verminderen door inname na de maaltijd).

Zelden (0,01-0,01%):

Overgevoeligheidsreacties. Zie bijsluiter

Zeer zelden (< 0,01%):

zie bijsluiter.

In verband met mogelijke bijwerkingen zal regelmatig uw bloed worden gecontroleerd. Hierover licht uw IBD verpleegkundige of IBD arts u in.

Griepvaccinatie

Omdat u door de behandeling met Azathioprine (Imuran®)/mercaptopurine (Puri-Nethol®) en Allopurinol gevoeliger bent

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

voor infecties komt u in aanmerking voor griepvaccinatie via uw huisarts.

Vruchtbaarheid

Allopurinol lijkt geen invloed te hebben op de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen.

Zwangerschap

In eerste trimester van de zwangerschap Allopurinol staken.

Licht uw behandelend arts of verpleegkundige tijdig in dat u een zwangerschapswens heeft en deze middelen gebruikt.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de veiligheid van allopurinol bij het geven van borstvoeding.

Registratie

Allopurinol is onder andere geregistreerd voor de behandeling van Jicht. Vandaar dat u in de bijsluiter adviezen zult aantreffen die niet terug te vinden zijn in deze folder en ook niet van toepassing zullen zijn op uw situatie. Mocht u daardoor toch nog vragen hebben neem dan contact op met uw behandelend arts of verpleegkundige.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw IBD verpleegkundige.

U kunt bellen naar het MDL centrum, telefoonnummer; 088 708 70 70.

Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL artsen binnen respectievelijk het NNIC en de ICC. De folder is ontwikkeld conform NNIC richtlijnen om uniformiteit binnen de voorlichting ten aanzien van IBD patiënten in Nederlandse zorginstellingen na te streven. Op basis van goed hulpverlenerschap kan onder bepaalde omstandigheden van de inhoud worden afgeweken.