

Huidtest bij en wesp

Met behulp van deze test kan worden nagegaan of u allergisch bent voor bijen- en/of wespengif. Dit onderzoek zal ongeveer 30 minuten duren.

Verloop van het onderzoek

Deze test vindt plaats door middel van een vloeistof waarin het bijen- en wespengif is opgelost. Er wordt begonnen met een zeer lage concentratie van deze giften. De vloeistof zal op de binnenkant van uw onderarm worden gedruppeld. Met een klein lancet wordt de huid aangeprikt, zodat de vloeistof net onder de huid contact kan maken. Na ongeveer 15 minuten kan de uitslag van de test worden bekeken. Mocht u niet, of niet voldoende hebben gereageerd dan zal zich deze procedure herhalen met een steeds hogere concentratie van het gif. Wanneer u reageert zal er een iets jeukende, rode uitslag ter plaatse ontstaan. Deze zal overigens snel weer wegtrekken.

Afspraak

Er is voor u een afspraak bij de polikliniek allergologie gemaakt op:

..... dag ... / ... / ...

..... uur

Vorbereidingen thuis

- Medicijnen tegen allergie en enkele antidepressiva dienen 72 uur van te voren worden gestaakt (zie medicijnlijst pagina 2).
- Gebruik geen bodylotion e.d. op onderarmen.

Uitslag

Uw behandelend medisch specialist deelt u de uitslag van het onderzoek mee.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tijdens kantooruren kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek allergologie ZGT, telefoonnummer 088 708 52 30.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Medicijnenlijst t.b.v. allergietest

Medicijnen tegen allergie en jeuk 72 uur van te voren staken

acrivastine	mehydroline
Aerius	mizolastine
alimemazine	Mizollen
Allerfre	montelukast
Allergodil (Azelastine)	Nalcrom
Atarax	Nedeltran
cetirizine	Neoral
ciclosporine	oxatomide
Claritine	Periactin
clemastine	Polaramine
cromoglicinezuur	Prevalin
cyproheptadine	promethazine
desloratadine	Reactine
dexchlorfeniramine	Rupatadine
dimetindeen	Rupafin
Dymista	Semprex
ebastine	Singulair
Fenistil	Tavegil
fexofenadine	Telfast
hydroxyzine	terfenadine
Kestine	Tinset
ketotifen	Xyzal
levocetirizine	Zaditen
Livocab (Levocabastine)	Zyrtec
Lomudal	
loratadine	

Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid 72 uur van te voren staken

betahistine	Emesafene
Betaserc	meclozine
chlorcyclizine/ cinnarizine	meclozine/pyridoxine
cinnarizine	Primatour
cyclizine	Suprimal
Doxylamine/pyridoxine Xonvea	

Antidepressiva 72 uur van te voren staken

amitriptyline	Prothiaden
Anafranil	Quetiapine
clomipramine	Remeron
dosulepine	Sarotex
doxepine	Seroquel
maprotiline	Sinequan
mianserine	Tolvon
mirtazapine	trazodon
Nortrilen	Trazolan
nortriptyline	Tryptizol

Bètablokkers 48 uur van te voren staken

Acebutalol	Metoprolol
Atenolol	Nebilet
Bisoprolol	Nebivolol
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorm	Propranolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

Maag/darm medicijnen 72 uur van te voren staken

Axid	Pepcidin
cimetidine	ranitidine
famotidine	Tagamet
nizatidine	Zantac
Pepcid	

Medicijnen tegen hoesten 72 uur van te voren staken

Oxomemazine	
Toplexil	