

Opspuiten maagbandje

Uw behandelend medisch specialist heeft u voor het opspuiten van uw maagbandje verwezen naar de afdeling radiologie (röntgen). Dit is een afdeling waar radiologen en radiodiagnostisch laboranten met behulp van verschillende technieken, afbeeldingen van het lichaam maken. Bij het maken van foto's wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen kunnen verschillende delen in het lichaam zichtbaar maken en geven daarvan een afbeelding op een beeldscherm. Nadat de foto's gemaakt zijn, worden deze door een radioloog beoordeeld.

Melden

Wanneer u zich meldt bij de balie verwijst de baliemedewerker u naar de juiste wachtruimte. Neemt u een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee.

Verhinderings

Wanneer u door omstandigheden niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op.

Waarschuwingen

Het is ongewenst dat dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Patiënten die hierover in onzekerheid verkeren, dienen contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Vorbereiding

U mag 2 uur voorafgaand aan het onderzoek niet meer eten, drinken of roken. Gebruikt u medicijnen? Dan kunt u deze op de normale manier volgens schema innemen. Wanneer u tijdens het onderzoek een kledingstuk aan wilt houden, wordt u verzocht een t-shirt mee te nemen zonder metaal/ knoopjes of strass-steentjes.

Verloop van het onderzoek

U wordt opgehaald uit de wachtruimte en naar de kleedkamer begeleidt. Daar wordt u verteld welke kledingstukken u uit moet doen voor het onderzoek. U komt te liggen op onze kantelbare onderzoekstafel. De radioloog of arts-assistent maakt een foto om te kijken hoe het maagbandje is geplaatst. Daarna wordt de plaats van de punctie ontsmet met een desinfectiemiddel. Het maagbandje wordt opgespoten of er wordt vloeistof uit gehaald. De naald zal vervolgens worden verwijderd en u krijgt een pleister. Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek een contrastmiddel moet drinken, dit zorgt voor beter beoordeelbare beelden.

Na afloop van het onderzoek

Wanneer u bariumcontrast hebt gedronken zal uw ontlasting een aantal dagen na het onderzoek licht van kleur zijn. Dit komt door het bariumpap en is onschuldig. Als u na het onderzoek veel drinkt, verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam en is er minder kans op verstopping.

Heeft u vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze gerust. Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.