

Peritoneaal dialyse katheter

Binnenkort wordt u opgeroepen voor het plaatsen van een peritoneaal dialyse katheter, afgekort ook wel PD-katheter genoemd. Voor het plaatsen van een PD-katheter wordt u opgenomen op een verpleegafdeling van het ziekenhuis. Het inbrengen van de katheter vindt plaats op de operatiekamer. Uitgebreidere informatie rondom de opname krijgt u van de afdeling opnameplanning en anesthesie. In deze folder vindt u informatie over wat u te wachten staat voor, tijdens en na de operatie.

Vorbereiding

De dag voor de operatie moet u 's middags de Microlax gebruiken, die u van de dialyseverpleegkundige heeft gekregen. Dit is nodig, omdat voor de operatie de darmen goed schoon moeten zijn. De dialyseverpleegkundige geeft u uitleg hoe u de Microlax moet gebruiken.

De opname

U wordt de ochtend van de operatie opgenomen op de verpleegafdeling. U krijgt eerst een intakegesprek met de afdelingsverpleegkundige. De PD verpleegkundige tekent samen met u de plek af waar de katheter bij voorkeur ingebracht zal worden. Dit is nodig om zo weinig mogelijk ongemak van kleding te ondervinden. Daarom is het belangrijk om kleding mee te nemen, die u veel draagt. Ook geeft zij informatie over de operatie en de periode erna.

De operatie

De toegang tot de buikholte wordt verkregen via de PD-katheter. Deze katheter wordt door de chirurg, onder algehele narcose, door de buikwand in de buikholte gebracht. De katheter wordt aan de binnenkant van de buikwand vastgehecht met behulp van een 'cuff', een soort siliconenwatje.

U krijgt enkele sneetjes in de buik, met hechtingen. Enkele centimeters boven deze snee komt de katheter naar buiten, door de zogenaamde 'huidpoort'.

Nazorg

Na de operatie wordt er gelet op lekkage van de buikwond en de huidpoort.

De dialyseverpleegkundige komt bij u langs om verdere afspraken te maken, onder andere over de verbandwissel en de start van de PD-training. De dag na de operatie mag u naar huis. U wordt geadviseerd om rustig aan te doen.

Verzorging van de buikwond/PD-katheter

De eerste dagen na de operatie zal de buik gevoelig blijven. U kunt tijdens de opname bij de specialist om pijnstillers vragen. De katheter en de wondjes zijn volledig afgeplakt als u naar huis gaat. Dit is om ontsteking te voorkomen. U krijgt een afspraak mee voor verbandwissel na 3 dagen. Tot die tijd mag u deze niet zelf vervangen. Als de pleister loslaat, deze is doorgelekt, of u krijgt koorts dan moet u contact opnemen met de dialyseafdeling. De eerste weken mag u niet douchen, omdat de huidpoort nog moet genezen. Tijdens de PD-training wordt bekeken wanneer u met douchen mag starten.

Tillen

Tot aan de PD-training mag u niet tillen. De operatiewond heeft voldoende rust nodig om te genezen. Ook na de eerste periode moet u altijd rekening blijven houden met uw PD-katheter. Til niet te zwaar!

Ontlasting

Het is erg belangrijk om dagelijks ontlasting te hebben. U krijgt daarom bij uw ontslag uit het ziekenhuis een recept mee voor een laxeermiddel. Wanneer zich thuis problemen voordoen met de ontlasting, kunt u het recept inleveren bij uw apotheek en direct starten met het laxeermiddel.

Bij problemen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de dialyseafdeling. Maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 20.45 uur op telefoonnummer: 088 708 43 50.

Buiten deze tijden kunt u in dringende situaties contact opnemen met de receptie van het ziekenhuis, telefoonnummer: 088 708 78 78.

U wordt dan doorverbonden met een verpleegkundige of een specialist van de dialyseafdeling.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.