

Het verruimen van een nauwe gehoorgang (= meatusplastiek)

Uw toegang tot de gehoorgang (meatus) is vernauwd. De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft in overleg met u besloten om deze vernauwing door middel van een operatie te behandelen. In deze folder geven wij u hierover meer informatie.

Uw gehoorgang (meatus) is vernauwd

In het midden van de oorschelp zit de gehoorgang die naar het trommelvlies leidt. De overgang van de oorschelp naar de gehoorgang wordt de meatus genoemd. Dit deel van de gehoorgang is van kraakbeen. Het is soepel en beweeglijk. Verder in de diepte gaat het kraakbenige deel over in het benige, 'harde' deel van de gehoorgang. Dit is ongeveer één centimeter lang. Hierna begint het trommelvlies.

Wanneer is een operatie nodig?

- Een te nauwe ingang van de gehoorgang kan steeds terugkerende ontstekingen van de gehoorgang veroorzaken.
- Soms kan een hoortoestel niet goed worden gedragen doordat het oorstukje van het toestel niet goed past in de nauwe gehoorgang.
- Bij mensen met een radicaalholte (dat is een holte waarbij de gehoorgangachterwand operatief is verwijderd vanwege bepaalde oorontstekingen), kan een te nauwe toegang tot de holte aanleiding geven tot chronisch ontstekingen van de holte.

De ingreep

De KNO-arts voert deze ingreep in het algemeen uit onder lokale verdoving. Dit gebeurt meestal poliklinisch en duurt gemiddeld 20 minuten. U mag na de behandeling weer naar huis.

De KNO-arts maakt een huidsnede in de oorschelp ter hoogte van de ingang van de gehoorgang. Hierna wordt huid, bindweefsel en een stukje kraakbeen van de oorschelp verwijderd. Vervolgens hecht de KNO-arts de huid op zo'n manier dat er uiteindelijk een ruimere toegang tot de gehoorgang ontstaat.



De uitwendige gehoorgang na correctie
Bron afbeelding: Laurentius Ziekenhuis

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Na de ingreep

Na de operatie wordt een gaasje met antibioticazalf ingebracht. Dit wordt na één week verwijderd. Mocht het gaasje er onverhoopt uitkomen, dan is het belangrijk om er niet aan te trekken. Beter kan het uitstekende deel worden afgeknipt. Meestal worden er zelf-oplosbare hechtingen gebruikt. De pijn na de ingreep is beperkt en kan worden behandeld met paracetamol. Het is niet ongebruikelijk dat er direct na de operatie nog wat bloed uit het oor komt. Zorg er in de eerste week voor dat er geen water in het oor komt. Dit doet u door tijdens het douchen een bekertje op het oor te houden. Ga niet zwemmen, baden of in de sauna.

Complicaties

De kans op complicaties bij deze ingreep is beperkt. Er is een kleine kans op infecties. Als u koorts krijgt of het oor wordt pijnlijk, rood en dik, neem dan contact op met het secretariaat van de KNO-artsen.

Vragen

Heeft u na de operatie thuis nog vragen of doen zich thuis problemen voor, neem dan als volgt contact op met het ziekenhuis:

- Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KNO-artsen, telefoonnummer 088 708 33 50.
- Bij vragen die niet kunnen wachten tot de volgende dag of na het weekend kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.